

Hűtött termoterápia kíméletes és hatékony eljárás

- Minimálisra csökkenthető a szövődmények száma
- Új sebészeti eljárás hazánkban a jóindulatú prosztatata megnagyobbodás kezelésére
- Az OEP is finanszírozza

A jóindulatú prosztatata megnagyobbodás (BPH) a férfiakban általában 50 éves kortól észlelhető, és az életkor növekedésével egyre gyakrabban fordul elő. A BPH az idősödő férfiak leggyakoribb megbetegedése.

Az utóbbi két évtizedben a BHP kezelésére több új, alternatív eljárást vezettek be, ezek egyike a mikrohullámú termoterápia.

— Budapesten, az Istenhegyi Klinikán a rendkívül modern „hűtött prostatatermoterápiát”, azaz hűtéssel működő termoterápiás kezelést alkalmazzuk – mondja dr. Dimitar Sumov.

Különböző tanulmányok eredményei alapján a TUMT kevés szövődménnyel járó, biztonságos és hatékony. Az eljárás ötvözi a korábbi megoldások előnyeit azzal, hogy a folyamatos hűtésnek köszönhetően nem károsodik a húgycső szövete. A minimálisan invazív beavatkozás, helyi érzéstelenítésben és azon betegek esetében is alkalmazható, akik a nagyobb műtéti terhelésre nem alkalmasak.

Sokan küzdenek ilyen problémával

A prosztatata jóindulatú megnagyobbodás (BHP) a férfiak körében is intim témának számít, amelyről legfeljebb orvosukkal váltanak szót, akkor, amikor vizeelési panaszuk súlyosbodnak.

Pedig problémáikkal nincsenek egyedül. Hazánkban évente mintegy 400 ezer beteg szorul orvosi kezelésre a panaszok következtében. A kezelésektől való félelem nem minden ok nélküli, hiszen a jelenleg ismert gyógyszeres terápia hatékonysága nem a legtökéletesebb, az alkalmazott radikálisabb műtéti beavatkozásoknak pedig egyike sem kockázatmentes, ráadásul egy sor kellemetlen mellékhatással járhatnak.

Tünetek:

A jóindulatú prosztatata megnagyobbodásra utaló jelek:

1. Nehezen meginduló, illetve gyakran elakadó vizelet. Sokszor kell „hasprést” alkalmazni.
2. Gyakori és sürgető vizelési kényszer.
3. Többszöri éjszakai látogatás a mellékhelyiségben.
4. A vizelés után a hólyag telítettségének érzése nem szűnik meg, újabb vizelési inger lép fel.
5. Ugyancsak jellemző a vizelés nehéz befejezése, az úgynevezett „utócsepegés” jelentkezése.